



	Vaccin	Quand faut-il vacciner?	Recommandations démographiques	Conseils pratiques	Vacciné le	Prochaine date
Vaccins sûrs	Vaccin contre la grippe	Chaque année	Un des critères suivants : • Patients de plus de 50 ans • Patients atteints d'une maladie chronique (polyarthrite rhumatoïde) • Patients immunodéprimés	Faites-vous vacciner contre la grippe CHAQUE année	JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
	Pneumovax	Administrer de préférence le vaccin au moment du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou à tous les 5 à 10 ans	Sans restrictions d'âge Vaccins recommandés pour tous les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde	Établissez un calendrier des vaccinations avec votre médecin pour vous assurer de recevoir ces vaccins au bon moment.	JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
	Tétanos, diphtérie, coqueluche	Tous les 10 ans			JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
Vaccins sûrs avec précautions	Varicelle, zona	Au moment du diagnostic, avant la prise d'ARMM ou de médicaments biologiques	Sans restrictions d'âge Vacciner avant la prise d'ARMM ou de médicaments biologiques	<ul style="list-style-type: none"> Tous ces vaccins sont « VIVANTS » Ils peuvent causer des maladies chez les patients qui ont un système immunitaire plus faible Certains médicaments utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde peuvent affaiblir le système immunitaire Vous ne pouvez recevoir ces vaccins si vous prenez des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire 	JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
	Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)				JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
	Fièvre jaune, vaccin antipoliomyélitique oral, vaccin contre les salmonelles, vaccin contre la grippe par voie nasale				JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
Circonstances spéciales	Hépatite A	Effets inconnus chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde	Effets inconnus chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde	Nous ne disposons pas de suffisamment d'information médicale pour recommander ce vaccin. Parlez à votre médecin.	JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
	Hépatite B	S'il y a risque d'infection* (voir ci-dessous pour connaître les risques)	Sans restrictions d'âge Seulement s'il y a risque d'infection	<p>Facteurs de risque</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez des rapports sexuels non protégés avec plus d'un partenaire ou avec quelqu'un infecté avec le virus de l'hépatite B; Vous avez contracté une maladie sexuellement transmissible comme la gonorrhée ou la chlamydia; Vous êtes un homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes; Vous partagez des aiguilles durant l'usage de drogues par voie intraveineuse; Vous habitez avec une personne souffrant d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B; Vous possédez un emploi qui vous expose à du sang humain; Vous recevez des traitements d'hémodialyse car vous présentez une insuffisance rénale terminale; ou Vous voyagez dans des régions à forte prévalence d'infection par l'hépatite B, notamment l'Afrique, l'Asie centrale et du Sud-Est et l'Europe orientale 	JJ/MM/AA	JJ/MM/AA
	Papillomavirus humain (PVH)	Le vaccin contre le PVH est le plus efficace si administré aux filles avant le début des rapports sexuels.	Le vaccin est habituellement administré aux filles âgées entre 10 et 14 ans	Il est préférable de donner le vaccin avant le début des rapports sexuels. Le vaccin est administré dans une série de 3 injections échelonnée sur une période de 6 mois.	JJ/MM/AA	JJ/MM/AA