

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont des cellules immunitaires particulières appelées lymphocytes T qui « s'activent » et attaquent les articulations. L'abatacept est un agent biologique qui empêche les lymphocytes T de « s'activer » et contribue à soulager la douleur et l'enflure associées à l'arthrite.

### Administré en perfusion intraveineuse



On administre l'abatacept en perfusion intraveineuse toutes les quatre semaines. La dose normale est établie en fonction de votre poids corporel.

### Administré toutes les quatre semaines



Vous recevrez une perfusion à la semaine 0, à la semaine 2, puis toutes les 4 semaines. Chaque perfusion prend environ 30 à 60 minutes.


### Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients se sentent mieux assez rapidement, chez d'autres, il faut plus de temps au médicament pour agir. Continuez de prendre votre médicament.

## Ce qu'il faut faire

### Ne le prenez pas si vous souffrez d'une infection



L'abatacept peut réduire votre capacité de lutter contre les infections. Il faut appeler votre médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

### Assurez-vous de subir un test de dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer l'abatacept. Parlez-en à votre médecin.

### Prélèvements sanguins occasionnels



Vous devrez subir des analyses sanguines occasionnelles pour assurer le suivi de votre arthrite.

## Effets secondaires et faits importants

### Réactions aux perfusions



L'abatacept peut, dans de rares cas, occasionner une réaction allergique durant la perfusion.

### Chirurgie



L'abatacept doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

### Grossesse et allaitement



L'abatacept n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

### Emphysème/mpoc



L'abatacept peut aggraver les symptômes d'emphysème (MPOC - maladie pulmonaire obstructive chronique) et la pneumonie. Informez votre médecin si vous souffrez d'emphysème ou de MPOC.

### Cancer



Dans de très rares cas, l'abatacept a été associé au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.


## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Érythème cutané