

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop d'IL-1 (interleukine-1). L'IL-1 est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. L'anakinra est un agent biologique qui inhibe l'IL-1 et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

Administré par injection



L'anakinra est administré par injection une fois par jour. La dose normale est de 100 mg par jour.

Le prendre tous les jours



L'anakinra doit être pris tous les jours. On peut vous enseigner, à vous, à un ami ou à un membre de votre famille, la technique d'injection.

Laissez-lui le temps d'agir



Il faut parfois quelques semaines avant de savoir si l'anakinra agit. Continuez de prendre votre médicament et discutez avec votre médecin.

Ce qu'il faut faire

Prélèvements sanguins périodiques



Il est important de subir régulièrement des analyses sanguines pendant le traitement par anakinra pour assurer le suivi de votre arthrite et de vos numérations globulaires (sanguines).

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



L'anakinra peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez le médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



L'anakinra n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Effets secondaires et faits importants

Réactions au point d'injection



Dans de rares cas, l'anakinra peut occasionner une réaction (rougeur, enflure, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez votre médecin si ces réactions sont graves. Elles peuvent s'améliorer avec le temps.

Chirurgie



L'anakinra doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

Cancer



L'anakinra n'a pas été associé au cancer. On ignore si un emploi prolongé du médicament peut accroître ce risque. Veuillez en discuter avec votre médecin.


Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Érythème cutané

Autres renseignements importants

Pour cesser l'anakinra



Vous pouvez simplement arrêter de prendre l'anakinra. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.