

## Comment prendre ce médicament

### Qu'est-ce que c'est?



L'avacopan est un médicament utilisé pour traiter les vascularites associées aux ANCA telles que la granulomatose avec polyangéite (GPA) ou la polyangéite microscopique (MPA).

### Le prendre deux fois par jour



L'avacopan est pris deux fois par jour. L'avacopan se présente sous forme de gélules de 10 mg. La dose habituelle est de 30 mg deux fois par jour.

### Soyez patient



Certains patients peuvent se sentir mieux assez rapidement, alors que d'autres doivent attendre un peu plus longtemps avant de voir des résultats.

## Ce que vous devez faire

### Faites analyser votre sang régulièrement



Vous devrez subir des prises de sang régulièrement (votre médecin vous dira à quelle fréquence). Ces analyses sont importantes pour s'assurer que l'avacopan n'affecte pas votre foie, vos muscles ou votre numération globulaire.

### Vaccination



L'avacopan peut ne pas être sûr à prendre avec certains vaccins (vivants), parlez-en à votre médecin.

### Assurez-vous de subir un test de dépistage de l'hépatite B



Tous les patients doivent subir un test de dépistage de l'hépatite B avant de commencer un traitement par l'avacopan.

### Ne prenez pas ce médicament si vous avez une infection



En prenant l'avacopan, vous pourriez avoir plus de difficulté à combattre les infections. Appelez votre médecin si :

1. vous avez de la fièvre
2. vous pensez avoir une infection
3. vous prenez des antibiotiques

### Évitez de tomber enceinte ou d'allaiter



Aucune étude n'a été faite sur la prise de avacopan pendant la grossesse. Si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin. L'avacopan peut causer du tort au bébé que vous portez.

## Effets secondaires et renseignements

### Nausées



L'avacopan peut provoquer des nausées, de la diarrhée, des vomissements ou des douleurs abdominales. Informez votre médecin si cela est grave.

### Infection des voies respiratoires supérieures



L'avacopan peut provoquer des symptômes de rhume.

### Érythème cutané



L'avacopan peut, dans de rares cas, provoquer un érythème cutané. Cessez de prendre le médicament et informez votre médecin si vous présentez un érythème cutané.

### Chirurgie



L'avacopan doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

### Interactions médicamenteuse



Vérifiez toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de commencer quelque nouveau médicament que ce soit.

## Quand dois-je appeler mon médecin

### Appelez si vous devez le cesser :



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons pour lesquelles vous devez appeler votre médecin :



la fièvre ou pensez avoir une infection



Vous devez subir une chirurgie



Vous êtes tombée enceinte



Vous prévoyez vous faire vacciner



Érythème cutané