

Le baricitinib

[Bear-EE-sit-in-ib]
Olumiant®

<http://Rheuminfo.com>
votre ressource en rhumatologie

Comment prendre ce médicament

Qu'est-ce que c'est?



Le baricitinib est un médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Quand vous prenez ce médicament, il est important de voir votre médecin et de faire analyser votre sang régulièrement.

Le prendre une fois par jour



Le baricitinib doit être pris une fois par jour. Le baricitinib est offert en comprimés en comprimés de 2 ou de 4 mg. La dose habituelle est de 2-4 mg, une fois par jour.

Soyez patient



Certains patients peuvent se sentir mieux assez rapidement, alors que d'autres doivent attendre un peu plus longtemps avant de voir des résultats. N'arrêtez pas de prendre votre médicament.

Ce que vous devez faire

Faites analyser votre sang régulièrement



Vous devrez subir des prises de sang régulièrement (votre médecin vous dira à quelle fréquence). Ces analyses sont importantes pour s'assurer que le baricitinib n'affecte pas vos reins, votre foie, votre sang ou votre taux de cholestérol.

Passez des tests pour la tuberculose



Tous les patients doivent passer un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie des poumons avant de commencer à prendre le baricitinib.

Ne prenez pas ce médicament si vous avez une infection



En prenant le baricitinib, vous pourriez avoir plus de difficulté à combattre les infections. Appelez votre médecin si :

1. vous avez de la fièvre
2. vous pensez avoir une infection
3. vous prenez des antibiotiques

Évitez de tomber enceinte ou d'allaiter



Aucune étude n'a été faite sur la prise de baricitinib pendant la grossesse. Si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin. Le baricitinib peut causer du tort au bébé que vous portez.

Vaccination



Le baricitinib peut augmenter votre risque de développer un zona. Veuillez parler à votre médecin du vaccin contre le zona.

Effets secondaires et renseignements

Nausées



Le baricitinib peut causer de légères nausées. Si vous avez une forte nausée, parlez-en à votre médecin.

Infection des voies respiratoires supérieures



L'effet indésirable le plus fréquent du baricitinib est les symptômes du rhume.

Douleurs intestinales



Dans de rares cas, le baricitinib a été associé à des lésions intestinales (perforations de la paroi de l'intestin). Si vous avez mal au ventre pendant votre traitement avec le baricitinib, dites-le à votre médecin.

Caillot de sang



Le baricitinib a très rarement été associé à la formation de caillots sanguins. Informez votre médecin si vous avez un nouvel gonflement des jambes ou un essoufflement.

Chirurgie



Le baricitinib doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

Cancer



Dans de très rares cas, le baricitinib a été associé à l'apparition d'un cancer. Si vous avez déjà eu un cancer, dites-le à votre médecin.

Quand dois-je appeler mon médecin

Appelez si vous devez le cesser :



- si vous vous sentez malade et que vous voulez arrêter de prendre votre médicament
- si vous vous inquiétez au sujet d'effets secondaires
- si vous voulez arrêter de prendre votre médicament ou avez déjà arrêté de le prendre

Autres raisons pour lesquelles vous devez appeler votre médecin :



la fièvre ou pensez avoir une infection



Vous devez subir une chirurgie



Vous êtes tombée enceinte



Vous prévoyez vous faire vacciner



gonflement des jambes avec une éruption