

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



Certaines personnes atteintes de lupus ont trop protéines appelées BLYS (Bliss). BLYS active des cellules immunitaires spéciales appelées cellules B qui attaquent le corps. Belimumab est un médicament biologique qui bloque l'activité de BLYS.

### Administré en perfusion intraveineuse (I.V.)



C'est une infirmière dûment formée qui administre le belimumab en perfusion intraveineuse (I.V.).

### Administré toutes les quatre semaines



Vous recevrez une perfusion la semaine 0, la semaine 2, puis toutes les 4 semaines. Chaque infusion dure environ 60 minutes.

### Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients commencent à se sentir mieux après avoir reçu le médicament, chez d'autres, il faut parfois de trois à quatre mois avant d'observer les effets.

## Ce qu'il faut faire

### Prélèvements sanguins occasionnels



Votre médecin vous dira à quelle fréquence vous devrez subir des analyses sanguines. Ceci est important pour surveiller votre lupus et afin de s'assurer que le belimumab n'affecte pas vos numérations globulaires (sanguines).

### Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Le belimumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

### Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le belimumab peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez le médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

## Effets secondaires et faits importants

### Réaction à la perfusion



Dans de rares cas, le belimumab peut provoquer une réaction allergique pendant la perfusion.

### Problèmes cardiaques



Informez votre médecin si vous développez des douleurs thoraciques ou un essoufflement.

### Mal de tête



Le belimumab peut rarement provoquer des maux de tête.

### Nausées et diarrhée



Certaines personnes se sentent mal avec des nausées/vomissements lorsqu'elles prennent du belimumab. Le belimumab peut également provoquer des diarrhées.

### Dites à votre médecin si vous avez été déprimé



Belimumab peut aggraver la dépression. Laissez votre médecin ou votre infirmière si vous ressentez aggravation de la dépression ou de pensées suicidaires.

### Chirurgie



Le belimumab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

### Cancer



Dans de très rares cas, le belimumab a été associé au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.


## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Dépression ou pensées suicidaires