

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



La cyclophosphamide est un médicament utilisé pour traiter des maladies comme le lupus et la vascularite. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important de subir des analyses sanguines et de voir régulièrement votre médecin.

À prendre sous forme de comprimés ou par voie I.V. (intraveineuse)



On administre la cyclophosphamide en comprimés ou par perfusion intraveineuse (I.V.). On prend les comprimés une fois par jour, tandis que les perfusions I.V. sont administrées toutes les deux à quatre semaines. Discutez-en avec votre médecin.

Soyez patient



Il faudra de six à 12 semaines pour que la cyclophosphamide agisse. Il est important de continuer de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



La cyclophosphamide peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cesser de prendre la cyclophosphamide et appelez votre rhumatologue si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Prélèvements sanguins périodiques



Vous devrez faire analyser votre sang **régulièrement** afin de vous assurer que la cyclophosphamide n'affecte pas votre foie ou vos numérations globulaires (sanguines).

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



La cyclophosphamide peut nuire à l'enfant à naître. Si vous avez des relations sexuelles ou si vous envisagez des relations sexuelles et que vous êtes fertile, il est important d'utiliser des mesures contraceptives. Nous recommandons les contraceptifs oraux.

Effets secondaires et faits importants

Nausées et malaises



Certaines personnes peuvent éprouver des nausées, des douleurs à l'estomac ou de la diarrhée lorsqu'elles prennent de la cyclophosphamide. Informez-en votre médecin, le cas échéant.

Érythème cutané



Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut provoquer un érythème cutané. Informez votre médecin si vous présentez un érythème cutané pendant que vous prenez de la cyclophosphamide.

Plaies à la bouche



Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut occasionner des plaies à la bouche. Informez votre médecin si cela devient problématique.

Perte des cheveux



Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut faire tomber les cheveux. Informez votre médecin si cela devient problématique.

Problèmes de vessie



La cyclophosphamide peut irriter la vessie. Cela peut provoquer de la douleur et des saignements. Si vous remarquez la présence de sang dans votre urine, informez votre médecin immédiatement. Il est important de boire de huit à 10 verres d'eau par jour.

Fertilité



La cyclophosphamide peut affecter la fertilité des femmes. Elle peut aussi affecter la numération spermatique des hommes. Ces effets peuvent être réversibles lorsque le médicament est cessé. Si vous envisagez d'éventuelles grossesses, il faut en discuter très sérieusement avec votre médecin.

Cancer



Lorsqu'on l'utilise pendant des périodes prolongées, la cyclophosphamide peut être associée à un léger accroissement du risque de lymphome et de cancer de la peau et de la vessie.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser




- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Nausées ou diarrhée



Fièvre ou infection soupçonnée



Grossesse ou grossesse planifiée



Présence de sang dans l'urine ou douleur en urinant



Chirurgie