

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



La cyclosporine est un médicament utilisé pour traiter des maladies comme le lupus et la vascularite. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important de subir des analyses sanguines et de voir régulièrement votre médecin.

### Le prendre deux fois par jour



La dose normale de cyclosporine est de 50 à 150 mg, deux fois par jour. Cette dose est établie selon votre poids. La cyclosporine est offerte sous forme de capsules et sous forme liquide.

### Soyez patient



Il faudra de trois à quatre mois pour que la cyclosporine agisse. Il est important de continuer de prendre le médicament.

## Ce qu'il faut faire

### Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



La cyclosporine peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cesser de la prendre et appelez votre rhumatologue si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

### Prélèvements sanguins périodiques



Vous devez faire analyser votre sang **régulièrement** afin de vous assurer que la cyclosporine n'affecte pas votre foie ou vos numérations globulaires (sanguines).

### Faites vérifier votre tension artérielle



La cyclosporine peut faire augmenter la tension artérielle. Il est important de la faire vérifier régulièrement.

### Interactions médicamenteuses



Plusieurs médicaments prescrits sont contre-indiqués avec la cyclosporine. Il faut discuter de tout nouveau médicament avec votre médecin.

## Effets secondaires et faits importants

### Nausées et malaises



Certaines personnes peuvent éprouver des nausées, des ballonnements, des douleurs à l'estomac ou de la diarrhée lorsqu'elles prennent de la cyclosporine. Il faut en informer votre médecin le cas échéant.

### Reins



La cyclosporine peut affecter vos reins. Votre médecin surveillera régulièrement l'état de vos reins au moyen d'analyses sanguines. Buvez de huit à 10 verres d'eau par jour pour bien irriguer vos reins.

### Foie



La cyclosporine peut irriter le foie. Il s'agit d'un phénomène rare que l'on dépiste au moyen d'analyses sanguines régulières.

### Autres effets secondaires

#### La cyclosporine peut entraîner d'autres effets secondaires :

- Fatigue
- Maux de tête
- Pilosité accrue au visage ou aux bras
- Enflure des gencives
- Rougeur
- Tremblements
- Picotements aux doigts, aux orteils, au bout du nez, à la langue ou aux lèvres
- Faiblesse et crampes musculaires

### Grossesse



En temps normal, on ne prend pas de cyclosporine pendant la grossesse. Si vous devenez enceinte ou prévoyez le devenir, informez-en votre médecin.

### Cancer



Lorsqu'on l'utilise pendant des périodes prolongées, la cyclosporine peut être associée à un faible risque de lymphome ou de cancer de la peau.

## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Élévation de la tension artérielle



Fièvre ou infection soupçonnée



Grossesse ou grossesse planifiée



Maux de tête intenses et récents



Chirurgie

## Autres renseignements importants

### Pour cesser la cyclosporine



Vous pouvez simplement arrêter de prendre la cyclosporine. Veuillez appeler votre médecin si vous cessez ce médicament.