

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



La duloxétine est un médicament utilisé pour traiter différents types de douleurs telles que les douleurs neuropathiques et la fibromyalgie.

### Le prendre une fois par jour



La duloxétine est à prendre une fois par jour.

### Capsules



La duloxétine est offerte en capsules de diverses teneurs. La dose de départ habituelle est de 30 à 60 mg, une fois par jour.

## Ce qu'il faut faire

### Prélèvements sanguins occasionnels



Vous devrez subir des analyses sanguines à l'occasion, pour vous assurer que la duloxétine n'endommage pas votre foie.

### Limitez votre consommation d'alcool



Lorsqu'on est traité par duloxétine, la consommation d'alcool peut irriter le foie. Il est préférable de limiter votre consommation d'alcool si vous buvez. Discutez-en avec votre médecin.

## Effets secondaires et faits importants

### Nausées et constipation



La duloxétine peut provoquer des douleurs à l'estomac, des nausées ou des vomissements. Elle peut aussi assécher la bouche et entraîner de la constipation.

### Étourdissements et confusion



La duloxétine peut provoquer des étourdissements. Dans de rares cas, elle provoquera de l'agitation ou de la confusion.

### Vision trouble



La duloxétine peut causer une vision trouble. Il faut informer votre médecin si vous souffrez de glaucome avant de commencer à prendre de la duloxétine.

### Tension artérielle



Dans de rares cas, la duloxétine peut faire augmenter votre tension artérielle. Votre médecin la surveillera. Informez-le si vous souffrez d'hypertension artérielle.

### Transpiration accrue



Dans de rares cas, il arrive que la duloxétine provoque une augmentation anormale de la transpiration.

### Maux de tête



Dans de rares cas, la duloxétine peut provoquer des maux de tête.

### Problèmes de vessie



La duloxétine peut provoquer la rétention urinaire et des problèmes d'élimination.

### Grossesse et allaitement



La duloxétine n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Étourdissements, confusion, agitation



Vision trouble



Augmentation de la tension artérielle



Douleurs graves à l'estomac



Grossesse

## Autres renseignements importants

### Cesser la duloxétine graduellement



Il faut cesser la duloxétine graduellement, sur une période d'une ou deux semaines.