

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop de TNF (abréviation anglaise de facteur de nécrose tumorale). Le TNF est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. L'éтанercept est un agent biologique qui inhibe le TNF et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

Administré par injection



On administre l'éтанercept par injection une fois par semaine. La dose normale est de 50 mg toutes les semaines. Parfois, on administre le médicament deux fois par semaine. Discutez-en avec votre médecin.

Administré une fois par semaine



L'éтанercept est administré une seule fois par semaine. On peut vous enseigner, à vous, à un ami ou à un membre de votre famille, la technique d'injection.

Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



L'éтанercept peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez votre médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Assurez-vous de subir un test de dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer l'éтанercept. Discutez-en avec votre médecin.

Prélèvements sanguins occasionnels



Il est important de subir occasionnellement des analyses sanguines pendant le traitement par éтанercept pour assurer le suivi de votre arthrite et de vos numérations globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants

Réactions au point d'injection



Dans de rares cas, l'éтанercept peut occasionner une réaction (rougeur, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez-en votre médecin si ces réactions sont graves.

Chirurgie



L'éтанercept doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

Grossesse et allaitement



L'éтанercept n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Problèmes cardiaques



L'éтанercept peut aggraver une maladie appelée insuffisance cardiaque congestive (ICC). Informez votre médecin si vous souffrez d'ICC.

Autres effets secondaires très rares



Dans de très rares cas, certains patients ont présenté des maladies affectant le système nerveux (sclérose en plaques) et le système immunitaire (lupus) alors qu'ils prenaient des médicaments comme l'éтанercept.

Cancer



Dans de très rares cas, l'éтанercept a été associé au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.


Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Érythème cutané

Autres renseignements importants

Pour cesser l'éтанercept



Vous pouvez simplement arrêter de prendre l'éтанercept. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.