Étanercept

Enbrel®, Brenzys®, Erelzi®

http:// Rheuminfo.com
votre ressource en rhumatologie

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est

Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop de TNF (abréviation anglaise de facteur de nécrose tumorale). Le TNF est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. L'étanercept est un agent biologique qui inhibe le TNF et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

Administré par injection

On administre l'étanercept par injection une fois par semaine. La dose normale est de 50 mg toutes les semaines. Parfois, on administre le médicament deux fois par semaine. Discutez-en avec votre médecin.

Administré une fois par semaine

L'étanercept est administré une seule fois par semaine. On peut vous enseigner, à vous, à un ami ou à un membre de votre famille, la technique d'injection.

Laissez-lui le temps d'agir

Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection

L'étanercept peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez votre médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Assurez-vous de subir un test de dépistage de la tuberculose

Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer l'étanercept. Discutez-en avec votre médecin.

Prélèvements sanguins occasionnels

Il est important de subir occasionnellement des analyses sanguines pendant le traitement par étanercept pour assurer le suivi de votre arthrite et de vos numérations globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants

Réactions au point d'injection

Dans de rares cas, l'étanercept peut occasionner une réaction (rougeur, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez-en votre médecin si ces réactions sont graves.

Chirurgie

L'étanercept doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

Grossesse et allaitement

L'étanercept a été utilisé en toute sécurité pendant la grossesse et l'allaitement. Informez votre médecin si vous envisagez de tomber enceinte ou si vous allaitez.

Problèmes cardiaques

L'étanercept peut aggraver une maladie appelée insuffisance cardiaque congestive (ICC). Informez votre médecin si vous souffrez d'ICC.

Autres effets secondaires très rares

Dans de très rares cas, certains patients ont présenté des maladies affectant le système nerveux (sclérose en plaques) et le système immunitaire (lupus) alors qu'ils prenaient des médicaments comme l'étanercept.

Cancer

Dans de très rares cas, l'étanercept a été associé au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :

Fièvre ou infection soupçonnée | Chirurgie | Grossesse | Vaccinations planifiées | Érythème cutané

Autres renseignements importants

Pour cesser l'étanercept

Vous pouvez simplement arrêter de prendre l'étanercept. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.

Copyright 2022 Rheuminfo Inc. (www.RheumInfo.com)
Niveau de facilité de lecture Flesch-Kincaid : 6.9