

# Ixekizumab

[Ix-e-ki-zu-mab]

Taltz

<http://Rheuminfo.com>  
votre ressource en rhumatologie

## Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont des niveaux trop élevés de IL-17. IL-17 est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure au niveau des articulations. L'ixekizumab est un agent biologique qui inhibe IL-17 et soulage la douleur et l'enflure causées par l'arthrite.

Administré par injection



On administre l'ixekizumab par injection à toutes les quatre semaines. La dose normale est de 80 mg aux quatre semaines.

Le prendre une fois aux 4 semaines



Vous recevrez 160 mg (deux doses) la première semaine, puis 80 mg à toutes les quatre semaines. La technique d'injection peut être enseignée directement au patient ou alors à un proche ou à un membre de la famille du patient.

Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients commencent à se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

## Ce que vous devez faire

Cesser votre traitement si vous êtes atteint d'une infection

L'ixekizumab peut affaiblir la capacité de votre corps à combattre les infections. Cessez votre traitement et appelez votre médecin si :



1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Faire un test de dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent passer un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer un traitement par ixekizumab. Parlez-en à votre médecin.

Faire des prises de sang occasionnelles



Il est important de faire des prises de sang de temps en temps pendant le traitement par ixekizumab pour assurer le suivi de votre arthrite.

## Effets secondaires et faits importants

Maladie inflammatoire de l'intestin



L'ixekizumab peut provoquer ou révéler une maladie inflammatoire de l'intestin (maladie de Crohn ou colite ulcéreuse). Avertissez votre médecin si vous faites de la diarrhée pendant votre traitement par ixekizumab.

Chirurgie



Le traitement par ixekizumab doit être interrompu avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement suite à une cicatrisation complète et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser de prendre le médicament.

Grossesse et allaitement



Les effets de l'ixekizumab chez les femmes enceintes n'ont pas été évalués. Veuillez informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Infection des voies respiratoires supérieures



Les symptômes du rhume représentent l'effet secondaire le plus courant du traitement par ixekizumab.

Réaction allergique



Dans de très rares cas, certains patients peuvent développer des réactions allergiques à l'ixekizumab. Arrêtez votre traitement par ixekizumab si vous développez de l'urticaire ou si vous faites une réaction allergique (sensation d'évanouissement, difficulté à respirer ou oppression de la gorge, oppression thoracique, gonflement du visage, des paupières, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge).

## Quand appeler votre médecin

Communiquez avec votre médecin si vous devez interrompre votre traitement



- si vous vous sentez malade et que vous voulez interrompre votre traitement
- si vous vous inquiétez au sujet des effets secondaires
- si vous désirez interrompre ou avez déjà interrompu votre traitement

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccination prévue



Éruption cutanée

## Autres renseignements importants

Pour cesser votre traitement par ixekizumab



Il suffit de cesser votre traitement par ixekizumab d'un coup. Il n'est pas nécessaire de le faire graduellement.