

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Le léflunomide est un médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important de subir des tests sanguins à l'occasion et de voir votre médecin régulièrement.

Le prendre une fois par jour



On prend généralement le léflunomide en comprimés de 10 ou de 20 mg, une fois par jour. Dans certains cas, on le prescrit à tous les deux jours.

Soyez patient



Il faudra de six à huit semaines pour que le médicament agisse. Il est important de continuer à le prendre.

Ce qu'il faut faire

Évitez l'alcool



La consommation d'alcool pendant un traitement par léflunomide pourrait endommager votre foie. Il est préférable de s'abstenir de consommer de l'alcool.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Le léflunomide peut nuire à l'enfant à naître. Si vous avez des relations sexuelles ou si vous envisagez des relations sexuelles et que vous êtes fertile, il est important d'utiliser des mesures contraceptives. Nous recommandons les contraceptifs oraux.

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le léflunomide peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Il est préférable de cesser de le prendre si vous présentez de la fièvre ou si vous croyez souffrir d'une infection. Appelez votre médecin pour lui demander conseil.

Prélèvements sanguins périodiques



Vous devez faire analyser votre sang **tous les mois** afin de vous assurer que le léflunomide n'affecte pas votre foie ou vos numérations globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants

Nausées, diarrhée et perte de poids



- Certaines personnes éprouvent des malaises et des nausées lorsqu'elles prennent du léflunomide.
- Le léflunomide peut aussi causer de la diarrhée. La diarrhée est parfois grave. Si vous présentez de la diarrhée, appelez votre médecin.
- Informez votre médecin si vous perdez du poids pendant votre traitement par léflunomide.

Tension artérielle



Dans de rares cas, le léflunomide peut faire augmenter votre tension artérielle. Votre médecin la surveillera. Informez votre médecin si vous souffrez d'hypertension artérielle.

Érythème cutané



Dans de rares cas, le léflunomide peut occasionner un érythème cutané. Informez votre médecin si vous présentez un érythème cutané pendant que vous prenez du léflunomide.

Chute des cheveux



Dans de rares cas, le léflunomide peut entraîner une chute des cheveux. Informez votre médecin si cela devient problématique.

Picotements aux mains et aux pieds



Dans de rares cas, le léflunomide peut occasionner des engourdissements ou des picotements aux mains et aux pieds.

Difficultés respiratoires



Dans de très rares cas, le léflunomide peut provoquer une réaction allergique au niveau pulmonaire. Appelez votre médecin si vous présentez une toux qui ne passe pas ou un essoufflement alors que vous prenez du léflunomide.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Diarrhée



Essoufflement



Érythème cutané



Grossesse ou grossesse planifiée



Chirurgie

Autres renseignements importants

Pour cesser le léflunomide



Vous pouvez simplement arrêter de prendre le léflunomide. Vous n'avez pas besoin de la cesser graduellement. Veuillez appeler votre médecin si vous cessez ce médicament.