

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Le mepolizumab est un médicament utilisé pour traiter l'asthme éosinophile et la granulomatose à éosinophiles avec polyangéite (EGPA). Le mepolizumab bloque une protéine appelée IL-5 qui limite la production d'une cellule sanguine appelée éosinophiles.

Administré par injection



Le mepolizumab est administré par injection une fois toutes les 4 semaines. La dose normale est de 100 mg pour l'asthme à éosinophiles et de 300 mg pour EGPA.

Prenez-le une fois par mois



Le mepolizumab est pris toutes les quatre (4) semaines. Vous, un ami ou un membre de votre famille pouvez apprendre à administrer les injections.

Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Prélèvements sanguins occasionnels



Il est important de faire analyser votre sang de temps en temps pendant que vous prenez du mepolizumab. Ceci est important pour suivre vos progrès.

Vaccination



Le mepolizumab peut augmenter votre risque de développer un zona. Veuillez parler à votre médecin du vaccin contre le zona.

Effets secondaires et faits importants

Réactions au point d'injection



Dans de rares cas, le mepolizumab peut occasionner une réaction (rougeur, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez-en votre médecin si ces réactions sont graves.

Réaction allergique



Les patients ont très rarement développé des réactions allergiques à le mepolizumab. Arrêtez de prendre le mepolizumab si vous développez de l'urticaire ou si vous avez une réaction allergique (sensation d'évanouissement, difficulté à respirer, oppression de la gorge ou de la poitrine, gonflement du visage, des paupières, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge).

Grossesse et allaitement




Le mepolizumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Maux de tête et fatigue



Le mepolizumab peut rarement provoquer des maux de tête et de la fatigue.

Maux de dos et douleurs articulaires



Le mepolizumab peut rarement provoquer des douleurs au dos et aux articulations.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Grossesse



Vaccinations
planifiées



Érythème
cutané

Autres renseignements importants

Pour cesser le mepolizumab



Vous pouvez simplement cesser de prendre le mepolizumab. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.