

# Mycophenolate

Cellcept®, Myfortic®

<http://Rheuminfo.com>  
your rheumatology resource

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



Le mycophénolate est un médicament utilisé pour traiter les maladies rhumatismales comme le lupus. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important que vous fassiez des analyses de sang et que vous consultiez votre médecin régulièrement.

### Comprimés



Le mycophénolate est disponible sous les noms Cellcept ou Myfortic. Cellcept se présente sous forme de comprimés de 500 mg. Myfortic se présente sous forme de comprimés de 180 et 360 mg.

### Prenez-le tous les jours



La dose normale de Cellcept est comprise entre 500 et 1500 mg deux fois par jour. La dose normale de Myfortic est comprise entre 180 et 720 mg deux fois par jour.

### Soyez patient



Il faudra de six à huit semaines pour que le médicament agisse. Il est important de continuer à le prendre.

## Ce qu'il faut faire

### Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le mycophénolate peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Il est préférable de cesser de le prendre si vous présentez de la fièvre ou si vous croyez souffrir d'une infection. Appelez votre médecin pour lui demander conseil.

### Prélèvements sanguins périodiques



Faites analyser votre sang régulièrement. Ceci est important pour s'assurer que le mycophénolate n'affecte pas votre foie ou votre numération globulaire.

## Effets secondaires et faits importants

### Nausées et malaises



Certaines personnes peuvent avoir mal à l'estomac ou développer une diarrhée lorsqu'elles prennent du mycophénolate. Veuillez informer votre médecin si cela se produit.

### Mal de tête



Le mycophénolate peut causer des maux de tête, des étourdissements et des troubles du sommeil.

### Infection cérébrale rare



Dans de très rares cas, des patients ont présenté une infection cérébrale rare appelée LMP (leucoencéphalopathie multifocale progressive) pendant un traitement par rituximab. Ce phénomène est très rare.

### Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Le mycophénolate peut nuire à l'enfant à naître. Si vous avez des relations sexuelles ou si vous envisagez des relations sexuelles et que vous êtes fertile, il est important d'utiliser des mesures contraceptives. Nous recommandons les contraceptifs oraux.

### Cancer



Lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes, le mycophénolate peut être associée à un faible accroissement du risque de cancer de la peau ou du sang.

## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Nausées ou diarrhée



Fièvre ou infection soupçonnée



Grossesse



Vaccinations planifiées



Chirurgie

## Autres renseignements importants

### Pour cesser le mycophénolate



Vous pouvez simplement arrêter de prendre le mycophénolate. Vous n'avez pas besoin de la cesser graduellement.

Copyright 2022 Rheuminfo Inc. ([www.RheumInfo.com](http://www.RheumInfo.com))  
Flesch-Kincaid Reading Grade: 8.1