

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop de IL-23. L'IL-23 est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. Le risankizumab est un agent biologique qui inhibe le IL-23 et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

### Administré par injection



On administre le risankizumab par injection toutes les douze semaines. La dose normale est de 150 mg.

### Administré toutes les douze (12) semaines



Vous recevrez une injection la semaine 0, la semaine 4, puis toutes les 12 semaines. Vous, un ami ou un membre de la famille pouvez apprendre à faire les injections.


### Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

## Ce qu'il faut faire

### Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le risankizumab peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez le médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

### Assurez-vous de subir un test de dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer le risankizumab. Parlez-en à votre médecin.

### Prélèvements sanguins occasionnels



Il est important de subir occasionnellement des analyses sanguines pendant le traitement par risankizumab pour assurer le suivi de votre arthrite et de vos numérations globulaires (sanguines).

## Effets secondaires et faits importants

### Réactions au point d'injection



Dans de rares cas, le risankizumab peut occasionner une réaction (rougeur, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez-en votre médecin si ces réactions sont graves.

### Chirurgie



Le risankizumab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

### Grossesse et allaitement



Le risankizumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

### Mal de tête et fatigue



Le risankizumab peut rarement provoquer des maux de tête et de la fatigue.

### Infection fongique de la peau



Le risankizumab a été associé au développement d'infections fongiques de la peau, notamment le pied d'athlète, l'eczéma marginé ou la teigne.

### Infection des voies respiratoires supérieures



L'effet indésirable le plus couramment observé par le risankizumab est rhume.


## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



éruption cutanée

## Autres renseignements importants

### Pour cesser l'ustekinumab



Vous pouvez simplement cesser de prendre le risankizumab. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.