

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont des cellules immunitaires particulières appelées lymphocytes B qui s'en prennent aux articulations. Le rituximab est un agent biologique qui détruit les lymphocytes B et aide à traiter les maladies auto-immunes.

Administré en perfusion intraveineuse (I.V.)



C'est une infirmière dûment formée qui administre le rituximab en perfusion intraveineuse (I.V.). Chaque perfusion peut durer de quatre à six heures.

Deux perfusions



Le rituximab est administré au jour 0, puis deux semaines plus tard. Le traitement peut être répété tous les six mois, bien que certaines personnes puissent espacer davantage les traitements.

Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients commencent à se sentir mieux après avoir reçu le médicament, chez d'autres, il faut parfois de trois à quatre mois avant d'observer les effets.

Ce qu'il faut faire

Prélèvements sanguins occasionnels



Votre médecin vous dira à quelle fréquence vous devrez subir des analyses sanguines afin de s'assurer que le rituximab n'affecte pas vos numérations globulaires (sanguines).

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Le rituximab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le rituximab peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez le médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Assurez-vous de subir un test de dépistage de l'hépatite B



Tous les patients doivent subir un test de dépistage de l'hépatite B avant de commencer un traitement par rituximab.

Effets secondaires et faits importants

Réaction à la perfusion



Dans de rares cas, le rituximab peut provoquer une réaction allergique pendant la perfusion. Il est rare que ces réactions soient graves. Pour prévenir les réactions à la perfusion, on administre un médicament appelé solumédrol (un corticostéroïde) avant.

Problèmes cardiaques



Le rituximab a été associé à un rythme cardiaque anormal. Informez votre médecin si vous souffrez de problèmes d'arythmie cardiaque.

Réactions cutanées rares



Dans de rares cas, on a signalé des réactions cutanées graves chez les patients traités par rituximab.

Infection cérébrale rare



Dans de très rares cas, des patients ont présenté une infection cérébrale rare appelée LMP (leucoencéphalopathie multifocale progressive) pendant un traitement par rituximab. Ce phénomène est très rare.

Chirurgie



Le rituximab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Érythème cutané