

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Le romosozumab est un médicament utilisé pour traiter la fragilisation des os (appelée ostéoporose).

Administré une fois par mois



On administre le romosozumab par injection une fois par mois. La dose normale est de 210 mg (2 seringues) toutes les mois. On peut vous enseigner, à vous, à un ami ou à un membre de votre famille, la technique d'injection.

Prenez le médicament pour 12 mois seulement



Le traitement par romosozumab est administré une fois par mois pendant 12 mois.

Ce qu'il faut faire

Calcium et vitamine D



Pour aider la formation des os, vous devez prendre du calcium et de la vitamine D pendant que vous êtes sous romosozumab. Votre médecin vous conseillera la bonne dose de calcium et de vitamine D à prendre.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Ne prenez pas de romosozumab si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.

Test de densité minérale osseuse (dmo)



Votre médecin surveillera votre réponse au romosozumab en vérifiant votre DMO. Cela s'effectue en général tous les un à trois ans. Discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Douleur à la mâchoire




Les médicaments comme le romosozumab ont été associés à un problème très rare de la mâchoire (l'ostéonécrose). Ce problème a été observé après des traitements dentaires. Il faut informer votre médecin si vous présentez une douleur subite à la mâchoire.

Maux de tête



Le romosozumab provoque parfois, mais rarement, des maux de tête.

Douleurs musculaires et osseuses



Le romosozumab peut provoquer des douleurs osseuses, musculaires ou articulaires.

Crise cardiaque et AVC



Le romosozumab peut augmenter légèrement le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Le romosozumab ne doit pas être administré aux patients ayant récemment fait une crise cardiaque ou un AVC ou ressenti une douleur thoracique grave due à une maladie cardiaque.

Taux faible de calcium



Le romosozumab peut faire diminuer le calcium sanguin. Ce phénomène est très rare. Informez votre médecin dans les cas suivants :

- Picotements aux mains, aux pieds et au pourtour de la bouche
- Crampes ou secousses musculaires
- Faiblesse musculaire

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Picotements aux mains, aux pieds ou au pourtour de la bouche



Grossesse ou grossesse planifiée



Douleur intense et récente à la mâchoire



Crampes, douleurs ou faiblesse musculaires



Essoufflement ou douleur à la poitrine

Autres renseignements importants

Pour cesser le romosozumab



Vous pouvez simplement arrêter de prendre le romosozumab. Veuillez appeler votre médecin si vous cessez ce médicament.