

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop d'IL-6. L'IL-6 est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. Le sarilumab est un agent biologique qui inhibe l'IL-6 et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

Administré par injection



Le sarilumab est administré par injection une fois tous les 1-2 semaines en fonction de votre poids corporel. La dose normale pour chaque injection est de 162 mg.

Prenez tous les 1-2 semaines



On peut vous enseigner, à vous, à un ami ou à un membre de votre famille, la technique d'injection.

Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Prélèvements sanguins périodiques



Vous devez subir régulièrement des analyses sanguines (votre médecin vous dira à quelle fréquence) afin de vous assurer que le sarilumab n'affecte pas votre foie, vos numérations globulaires (sanguines) ou vos taux de cholestérol.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Le sarilumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le sarilumab peut réduire votre capacité de lutter contre les infections. Il faut appeler votre médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer le sarilumab. Parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Réactions au point d'injection



Dans de rares cas, le sarilumab peut occasionner une réaction (rougeur, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez-en votre médecin si ces réactions sont graves.

Atteinte intestinale



Dans de rares cas, le sarilumab a été associé à une atteinte intestinale (perforation de la paroi de l'intestin). Informez votre médecin si vous éprouvez des douleurs au ventre durant votre traitement par sarilumab.

Cancer



De très rares cas de cancer ont été observés chez les patients traités par sarilumab. On ignore si le sarilumab provoque le cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.

Autres effets secondaires très rares



Les patients ont rarement eu des réactions allergiques au sarilumab.

Chirurgie



Le sarilumab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.


Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Érythème cutané