Secukinumab Cosentyx®

http://RheumInfo.com
votre ressource en rhumatologie

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est

Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop de IL-17. IL-17 est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. Le sécukinumab est un agent biologique qui inhibe IL-17 et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

Administré par injection

On administre le sécukinumab par injection. La dose normale est de 150 à 300 mg une fois par mois.

Prenez-le une fois par mois

Vous recevrez des injections hebdomadaires pendant les 5 premières semaines. Ensuite, vous recevrez une injection tous les mois. Vous, un ami ou un membre de la famille pouvez apprendre à faire l'injection.

Laissez-lui le temps d'agir

Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection

Le sécukinumab peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez le médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Assurez-vous de subir un test de dépistage de la tuberculose

Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer le sécukinumab. Parlez-en à votre médecin.

Prélèvements sanguins occasionnels

Il est important de subir occasionnellement des analyses sanguines pendant le traitement par sécukinumab pour assurer le suivi de votre arthrite et de vos numérations globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants

Maladie inflammatoire de l'intestin

Le sécukinumab peut provoquer des poussées une maladie inflammatoire de l'intestin (maladie de Crohn ou colite ulcéreuse). Informez votre médecin si vous développez une diarrhée pendant que vous prenez Le sécukinumab.

Chirurgie

Le sécukinumab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

Grossesse et allaitement

Le sécukinumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Infection des voies respiratoires supérieures

L'effet indésirable le plus couramment observé par le sécukinumab est rhume.

Réaction allergique

Les patients ont très rarement développé des réactions allergiques à le sécukinumab. Arrêtez de prendre le sécukinumab si vous développez de l'urticaire ou si vous avez une réaction allergique (sensation d'évanouissement, difficulté à respirer, oppression de la gorge ou de la poitrine, gonflement du visage, des paupières, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge).

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :

Fièvre ou infection soupçonnée | Chirurgie | Grossesse | Vaccinations planifiées | Érythème cutané

Autres renseignements importants

Pour cesser le sécukinumab

ARRÊT

Vous pouvez simplement cesser de prendre le sécukinumab. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.

Copyright 2022 Rheuminfo Inc. (www.RheumInfo.com)
Niveau de facilité de lecture Flesch-Kincaid : 7.3