

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



La sulfasalazine est un médicament utilisé pour traiter l'arthrite. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important de subir des tests sanguins à l'occasion et de voir votre médecin régulièrement.

Le prendre deux fois par jour



Prenez votre sulfasalazine le matin au petit-déjeuner et le soir avant de vous coucher.

Comprimés



La sulfasalazine est offerte en comprimés de 500 mg. La dose courante est de deux comprimés le matin et deux comprimés le soir. Votre médecin vous dira quelle dose vous convient.

Soyez patient



Il faudra de six à 12 semaines avant que la sulfasalazine agisse. Il est important que vous continuiez de prendre le médicament.

Ce qu'il faut faire

Prélèvements sanguins occasionnels



Vous devez subir des analyses sanguins **deux semaines après le début du médicament, puis tous les mois** pour vous assurer que la sulfasalazine n'endommage pas votre foie ou vos reins et qu'elle n'affecte pas vos numérations globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants

Nausées et malaises



Les effets secondaires les plus courants de la sulfasalazine sont les nausées et les malaises qui peuvent s'améliorer avec le temps à mesure que vous vous habituez au médicament.

Érythème cutané



La sulfasalazine peut causer un érythème cutané. Cessez le médicament et informez votre médecin si vous présentez un érythème cutané.

Maux de tête



Dans de rares cas, la sulfasalazine peut causer des maux de tête.

Grossesse et allaitement



La sulfasalazine avec acide folique 5 mg/jour avec peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse et l'allaitement. Informez votre médecin si vous envisagez de tomber enceinte ou si vous allaitez.

Sensibilité au soleil



Il arrive que la sulfasalazine rende la peau plus sensible au soleil. Portez un écran solaire.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Érythème cutané



Grossesse ou grossesse planifiée

Autres renseignements importants

Pour cesser la sulfasalazine



Vous pouvez simplement arrêter de prendre la sulfasalazine. Vous n'avez pas besoin de la cesser graduellement. Veuillez appeler votre médecin si vous cessez ce médicament.