

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Le tacrolimus est un médicament utilisé pour traiter les maladies rhumatismales telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important de subir des analyses sanguines et de voir régulièrement votre médecin.

Le prendre deux fois par jour



La dose normale de tacrolimus dépend de la maladie traitée et de votre poids corporel. La dose dans la polyarthrite rhumatoïde est de 3 mg pris une fois par jour.


Soyez patient



Il faudra un certain temps pour que le tacrolimus agisse. Il est important que vous continuiez à prendre le médicament.

Ce qu'il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le tacrolimus peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cesser de la prendre et appelez votre rhumatologue si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Prélèvements sanguins périodiques



Faites analyser votre sang régulièrement. Ceci est important pour s'assurer que la voclosporin n'affecte pas votre numération globulaire, glycémie, taux de potassium ou fonction rénale.

Faites vérifier votre tension artérielle



Le tacrolimus peut faire augmenter la tension artérielle. Il est important de la faire vérifier régulièrement.

Interactions médicamenteuses



Plusieurs médicaments prescrits sont contre-indiqués avec le tacrolimus. Il faut discuter de tout nouveau médicament avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Nausées et malaises



Certaines personnes peuvent éprouver des nausées, des ballonnements, des douleurs à l'estomac ou de la diarrhée lorsqu'elles prennent de le tacrolimus. Il faut en informer votre médecin le cas échéant.

Reins



le tacrolimus peut affecter vos reins. Votre médecin surveillera régulièrement l'état de vos reins au moyen d'analyses sanguines.

Cerveau



Le tacrolimus peut rarement être nocive pour le cerveau et les nerfs. Informez votre médecin si vous développez un mal de tête, un changement dans votre vision, des tremblements, des picotements dans les doigts, les orteils, le bout du nez, la langue ou les lèvres, ou toute confusion.

Autres effets secondaires

Le tacrolimus peut entraîner d'autres effets secondaires :

- Fatigue
- Perte de poids
- Faiblesse et crampes musculaires
- Augmentation de la glycémie

Coeur



Le tacrolimus peut rarement affecter le rythme cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques connus. Cela peut être aggravé s'il est combiné avec certains médicaments.

Grossesse



Le tacrolimus n'est normalement pas prise pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous tombez enceinte ou envisagez de tomber enceinte, veuillez en informer votre médecin.

Cancer



Lorsqu'on l'utilise pendant des périodes prolongées, le tacrolimus peut être associée à un faible risque de lymphome ou de cancer de la peau.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Élévation de la tension artérielle



Fièvre ou infection soupçonnée



Grossesse ou grossesse planifiée



Maux de tête intenses et récents



Chirurgie