

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop d'IL-6. L'IL-6 est une protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. Le tocilizumab est un agent biologique qui inhibe l'IL-6 et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

Administré par perfusion intraveineuse (I.V.)



C'est une infirmière dûment formée qui administre le tocilizumab en perfusion intraveineuse (I.V.). Chaque perfusion dure environ une heure.

À prendre une fois toutes les 4 semaines



On administre le tocilizumab toutes les quatre (4) semaines.

Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

Ce qu'il faut faire

Prélèvements sanguins périodiques



Vous devez subir régulièrement des analyses sanguines (votre médecin vous dira à quelle fréquence) afin de vous assurer que le tocilizumab n'affecte pas votre foie, vos numérations globulaires (sanguines) ou vos taux de cholestérol.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter



Le tocilizumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



Le tocilizumab peut réduire votre capacité de lutter contre les infections. Il faut appeler votre médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer le tocilizumab. Parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Réactions à la perfusion



Dans de rares cas, le tocilizumab peut occasionner une réaction allergique durant la perfusion.

Atteinte intestinale



Dans de rares cas, le tocilizumab a été associé à une atteinte intestinale (perforation de la paroi de l'intestin). Informez votre médecin si vous éprouvez des douleurs au ventre durant votre traitement par tocilizumab.

Cancer



De très rares cas de cancer ont été observés chez les patients traités par tocilizumab. On ignore si le tocilizumab provoque le cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.

Autres effets secondaires très rares



Dans de très rares cas, il est arrivé que des patients présentent des maladies du système nerveux alors qu'ils prenaient du tocilizumab.

Chirurgie



Le tocilizumab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.


Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Érythème cutané