

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



Certaines personnes atteintes d'arthrite ont trop de IL-12 et IL-23. Le IL-12 et IL-23 est protéine que l'on retrouve dans l'organisme et qui est responsable de la douleur et de l'enflure des articulations. L'ustekinumab est un agent biologique qui inhibe le IL-12 et le IL-23 et soulage la douleur et l'enflure de l'arthrite.

### Administré par injection



On administre l'ustekinumab par injection toutes les douze semaines. La dose normale est de 45 mg ou de 90 mg et est basée sur votre poids corporel.

### Administré toutes les douze (12) semaines



Vous recevrez une injection la semaine 0, la semaine 4, puis toutes les 12 semaines. Vous, un ami ou un membre de la famille pouvez apprendre à faire les injections.


### Laissez-lui le temps d'agir



Bien que certains patients puissent se sentir mieux assez rapidement, chez d'autres patients, il faut parfois un peu plus de temps. Continuez de prendre votre médicament.

## Ce qu'il faut faire

### Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection



L'ustekinumab peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cessez de le prendre et appelez le médecin si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

### Assurez-vous de subir un test de dépistage de la tuberculose



Tous les patients doivent subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et une radiographie pulmonaire avant de commencer l'ustekinumab. Parlez-en à votre médecin.

### Prélèvements sanguins occasionnels



Il est important de subir occasionnellement des analyses sanguines pendant le traitement par ustekinumab pour assurer le suivi de votre arthrite et de vos numérations globulaires (sanguines).

## Effets secondaires et faits importants

### Réactions au point d'injection



Dans de rares cas, l'ustekinumab peut occasionner une réaction (rougeur, douleur et démangeaisons) au point d'injection. Informez-en votre médecin si ces réactions sont graves.

### Chirurgie



L'ustekinumab doit être cessé avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, il faut discuter avec votre médecin du moment où il faudra cesser le médicament.

### Grossesse et allaitement



L'ustekinumab n'a fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

### Cancer



Dans de très rares cas, l'ustekinumab a été associé au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de cancer.

### Problèmes cérébraux rares



Les patients ont très rarement développé un problème cérébral rare appelé leucoencéphalopathie postérieure réversible lors de la prise d'ustekinumab. Ceci est très rare et potentiellement réversible. L'ustekinumab doit être arrêté si cela se produit.


## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Fièvre ou infection soupçonnée



Chirurgie



Grossesse



Vaccinations planifiées



Maux de tête, convulsions, confusion ou troubles de la vision

## Autres renseignements importants

### Pour cesser l'ustekinumab



Vous pouvez simplement cesser de prendre l'ustekinumab. Vous n'avez pas besoin de le cesser graduellement.