Voclosporin

Lupkynis®

http://Rheuminfo.com
votre ressource en rhumatologie

Comment utiliser ce médicament

Ce que c'est

La voclosporin est un médicament utilisé pour traiter les patients atteints de néphrite lupique active. Pendant que vous prenez ce médicament, il est important de subir des analyses sanguines et de voir régulièrement votre médecin.

Le prendre deux fois par jour

La dose normale de voclosporin est 23,7 mg (3 gélules de 7,9 mg) prises deux fois par jour. La dose peut être modifiée en fonction de votre fonction rénale ou hépatique..

Soyez patient

Il faudra un certain temps pour que la voclosporin agisse. Il est important que vous continuiez à prendre le médicament.

Ce qu'il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d'une infection

La voclosporin peut affaiblir votre capacité de lutter contre les infections. Cesser de la prendre et appelez votre rhumatologue si :

1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d'une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour traiter une infection

Prélèvements sanguins périodiques

Faites analyser votre sang régulièrement. Ceci est important pour s'assurer que la voclosporin n'affecte pas votre numération globulaire, votre taux de potassium ou votre fonction rénale.

Faites vérifier votre tension artérielle

La voclosporin peut faire augmenter la tension artérielle. Il est important de la faire vérifier régulièrement.

Interactions médicamenteuses

Plusieurs médicaments prescrits sont contre-indiqués avec la voclosporin. Il faut discuter de tout nouveau médicament avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Nausées et malaises

Certaines personnes peuvent éprouver des nausées, des ballonnements, des douleurs à l'estomac ou de la diarrhée lorsqu'elles prennent de la voclosporin. Il faut en informer votre médecin le cas échéant.

Reins

La voclosporin peut affecter vos reins. Votre médecin surveillera régulièrement l'état de vos reins au moyen d'analyses sanguines.

Cerveau

La voclosporin peut rarement être nocive pour le cerveau et les nerfs. Informez votre médecin si vous développez un mal de tête, un changement dans votre vision, des tremblements, des picotements dans les doigts, les orteils, le bout du nez, la langue ou les lèvres, ou toute confusion.

Autres effets secondaires

La voclosporin peut entraîner d'autres effets secondaires :

- Fatigue
- Maux de tête
- Brûlures d'estomac
- Faiblesse et crampes musculaires
- ulcères de la bouche
- chute de cheveux

Coeur

La voclosporin peut rarement affecter le rythme cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques connus. Cela peut être aggravé s'il est combiné avec certains médicaments.

Grossesse

La voclosporin n'est normalement pas prise pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous tombez enceinte ou envisagez de tomber enceinte, veuillez en informer votre médecin.

Cancer

Lorsqu'on l'utilise pendant des périodes prolongées, la voclosporin peut être associée à un faible risque de lymphome ou de cancer de la peau.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :

Élévation de la tension artérielle

Fièvre ou infection soupçonnée

Grossesse ou grossesse planifiée

Maux de tête intenses et récents

Chirurgie

Copyright 2022 Rheuminfo Inc. (www.RheumInfo.com)
Niveau de facilité de lecture Flesch-Kincaid : 7.3